

Infección del tracto urinario - Versión abreviada (Urinary Tract Infection - Brief Version)

¿Qué es una infección del tracto urinario?

El niño puede infectarse de la vejiga o del conducto que transporta la orina para sacarla del cuerpo. La infección la causa una bacteria y necesita tratamiento. Estos son síntomas que debe cuidar:

- El niño tiene dolor al orinar (hacer pipí).
- El niño tiene que hacer pipí de inmediato y no puede aguantarse.
- El niño hace pipí muchas veces.
- Aunque el niño esté despierto, moja la ropa.
- El niño se moja en la noche.
- La orina del niño huele mal.
- El niño tiene fiebre o dolor de estómago.

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo?

- **Déle antibiótico.** Para sentirse mejor, el niño necesita tomar la medicina recetada por el médico.
- **Déle mucha agua y líquidos.** Con esto le ayuda a librarse de la infección.
- **Déle medicina para el dolor y la fiebre.** Déle al niño acetaminofén (Tylenol) o ibuprofeno (Advil) para el dolor o para la fiebre más de 102°F (39°C). No le dé aspirina.
- **Llame a su médico.** Dos días después que el niño inicie con la medicina, llame al médico del niño para comentar los síntomas. Necesita estar seguro que el niño mejore.
- **Otro examen.** El niño necesitará otra prueba de orina 2 semanas después de la primer visita.

Llame de inmediato al médico de su hijo si:

- El niño tiene dolor de espalda.
- El niño se ve muy enfermo.

Llame al médico de su hijo durante horas de consulta si:

- El niño tiene fiebre por más de 2 días después de tomar la medicina.
- Al niño todavía le duele al orinar a los 2 días después de tomar la medicina.
- Tiene otras preguntas o preocupaciones.

Instrucciones especiales: